

# УРАТОР




**ТОРАСЕМІД** для тривалого керування набряками та тиском, забезпечує стабільний результат і комфорт пацієнта та гарантується програмою «Доступні ліки»<sup>2,3</sup>



✓ **УРАТОР - торасемід**, що знижує перед- та постнавантаження на серце<sup>1</sup>

✓ **УРАТОР – торасемід**, зі збалансованою фармакокінетикою та фармакодинамікою<sup>1,3</sup>





# УРАТОР

**ТОРАСЕМІД** для КОНТРОЛЮ СИМПТОМІВ  
ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ<sup>4,5</sup>



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

**1 раз на добу**

Вранці після їди

Дозу слід підбирати індивідуально<sup>3</sup>

## Коротка інструкція:

Уратор 10 мг РП № UA/20198/01/02 **Склад:** діюча речовина: торасемід (torasemide); 1 таблетка містить торасеміду 5 мг або 10 мг, або 20 мг; **Фармакотерапевтична група.** Сечогінні препарати. Високоактивні діуретики. Прості препарати сульфонамідів. Код АТХ С03С А04. **Показання.** Для лікування набряків, спричинених застоюю серцевою недостатністю, захворюваннями нирок або печінки. Для лікування есенціальної гіпертензії — застосовувати як монотерапію або у комплексній терапії з іншими гіпотензивними засобами. **Противпоказання.** Підвищена чутливість до діючої речовини, препаратів сульфонілсечовини або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу; ниркова недостатність з анурією; печінкова кома або прекома; артеріальна гіпотензія; аритмія; гіповолемія; гіпонатріємія; гіпокаліємія; гостре порушення сечовипускання, наприклад внаслідок гіпертрофії передміхурової залози; подагра; одночасне застосування з аміноглікозидами або цефалоспорином; ниркова недостатність після прийому препаратів, що викликають ураження нирок; період вагітності та грудного годування.

1 - P-231: Effect of torasemide in monotherapy or associated to other antihypertensive drugs on pulse pressure in essential hypertension | American Journal of Hypertension | Oxford Academic;

2 - <https://moz.gov.ua/uk/>;

3 — дані з інструкції для медичного застосування лікарського засобу;

4 - Comparative effectiveness of torasemide versus furosemide in symptomatic therapy in heart failure patients: Preliminary results from the randomized TORNADO trial - PubMed;

5 - Torasemide vs. furosemide in primary care patients with chronic heart failure NYHA II to IV—efficacy and quality of life - Müller - 2003 - European Journal of Heart Failure - Wiley Online Library;

На зображенні розміщене фото ймовірного пацієнта, який має підвищений артеріальний тиск та якому показаний даний препарат.

Інформація для професійної діяльності медичних працівників. Повна інформація про лікарські засоби міститься в інструкції для медичного застосування <http://www.driz.com.ua>

Представництво ТОВ «Амарокс Юкрейн Лімітед», м. Київ, вул. Машинобудівна, 35-А, Тел.:(044)303-97-53;

<https://www.heteroworld.com.ua>

**Amarox**<sup>®</sup>

Офіційний представник **HETERO** в Україні