


# Фібрига

Фібриноген людини


## Розумний крок для контролю кровотечі




Концентрат високого ступеня очищення<sup>1</sup>



Подвійна інактивація вірусів<sup>2</sup>



Швидка підготовка до введення<sup>3</sup>



Зберігання за кімнатної температури<sup>3</sup>

### Фібрига. Коротка інформація про препарат.

**Склад.** Діюча речовина: фібриноген людини; 1 флакон містить 1 г фібриногену людини. **Розчинник:** вода для ін'єкцій. **Лікарська форма.** Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій/інфузій. **Показання.** Лікування кровотечі і періопераційна профілактика у пацієнтів із вродженою гіпофібриногенемією чи афібриногенемією зі схильністю до кровотеч. Як додаткова терапія до лікування неконтрольованих сильних кровотеч у пацієнтів із набутим гіпофібриногенемією в процесі хірургічного втручання. **Противоказання.** Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини. **Спосіб застосування та дози.** Профілактика у пацієнтів із вродженою гіпофібриногенемією чи афібриногенемією та відомою схильністю до кровотеч. Щоб запобігти надмірним кровотечам під час хірургічних операцій, рекомендується профілактичне лікування для підвищення рівня фібриногену до 1 г/л. **Лікування кровотеч.** Кровотечі у пацієнтів із вродженою гіпофібриногенемією чи афібриногенемією. Кровотечі слід лікувати, щоб досягти рекомендованого цільового рівня фібриногену в плазмі крові 1 г/л. Цей рівень необхідно підтримувати до досягнення гемостазу. **Кровотечі у пацієнтів із набутим дефіцитом фібриногену.** Дорослі. Зазвичай спочатку вводять 1–2 г препарату з подальшими інфузіями препарату у разі необхідності. У разі сильної кровотечі, наприклад, під час обширного хірургічного втручання, може бути потрібна більша кількість фібриногену (4–8 г). **Спосіб застосування.** Внутрішньовенна інфузія чи ін'єкція. **Діти.** Дозу слід визначати відповідно до маси тіла та клінічної потреби. Зазвичай вона становить 20–30 мг/кг. **Термін придатності.** 2 роки. **Умови зберігання.** Зберігати при температурі менше 25 °С. Не заморожувати. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** 1. Октафарма АБ. 2. Октафарма Фармацевтика Продуктсгес. м.Б.Х.Рестраційне посвідчення № UA/18890/01/01 від 11.08. 2021

Перед використанням препарату необхідно ознайомитися з інструкцією із застосування.

Інформація для розповсюдження серед лікарів і фармацевтів під час семінарів, конференцій, симпозіумів та інших наукових заходів із медичної тематики.

### Література

- Schulz P et al. Biochemical characterisation, stability and pathogen safety of a new fibrinogen concentrate (Fibryga). *Biologicals*. 2018;52:72–77.
- Дані компанії «Октафарма».
- Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Фібрига (РП № UA/18890/01/01, Наказ МОЗ України № 1725 від 11.08.2021).

Представництво «Октафарма АГ» в Україні  
01025, м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 45-47-49 літера «А»,  
Фірма «Октафарма АГ», Швейцарська Конфедерація  
8853, м. Лахен, вул. Зайденштрассе 2  
Тел./Факс: +38 (044) 502 78 77  
e-mail: ukraine\_office@octapharma.com  
www.octapharma.com

octapharma